



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

دانشکده پرستاری و مامایی

عنوان:

تبیین فرایند شکل گیری مرگ اجتماعی در افراد مبتلا به شکستگی

مفصل ران

پایان نامه برای دریافت درجه دکتری تخصصی در پرستاری

نگارنده:

کلنار قانع

استاد راهنما:

دکتر هومن شهسواری

اساتید مشاور:

دکتر زهرا زارع

دکتر شیرین احمدنیا

دکتر بابک سیاوشی

۱۴۰۰

چکیده فارسی

تبیین فرایند شکل‌گیری مرگ اجتماعی در افراد مبتلا به شکستگی مفصل ران

مقدمه: شکستگی مفصل ران از جمله شایع‌ترین شکستگی‌های ارتوپدی؛ یک آسیب رایج، جدی و پیچیده می‌باشد که فرایند بهبودی نسبی، چالش‌برانگیز و بسیار طولانی مدت دارد و حتی ممکن است تا یک سال یا خیلی بیشتر ادامه داشته باشد. افراد با ناتوانی مزمن و عوارض طولانی مدت غیرقابل کنترل به دنبال شکستگی مفصل ران نیز دارای مشخصاتی هستند که ممکن است آن‌ها را جهت تجربه پدیده مرگ اجتماعی مستعد نماید. بدین صورت که با ناتوانی جسمی مداوم و بهبود نیافته این بیماران، عواملی از قبیل حریم خصوصی، مشارکت اجتماعی، استقلال به مخاطره می‌افتد که در نهایت موجب تضعیف هویت اجتماعی، عدم تعاملات اجتماعی و محرومیت اجتماعی آن‌ها می‌شود که می‌تواند پیامدهای ناگوار جسمی، روحی و اجتماعی داشته باشد. جهت طراحی مداخلات مراقبتی پیشگیری و کنترل مرگ اجتماعی، شناسایی ابعاد و ویژگی‌های این فرایند ضروری است. بنابراین هدف پژوهش حاضر، تبیین و درک فرایند شکل‌گیری و توسعه مرگ اجتماعی در افراد مبتلا به شکستگی مفصل ران در نظر گرفته شد.

روش کار: در پژوهش حاضر با رویکرد نظریه زمینه‌ای، از طریق روش نمونه‌گیری هدفمند و سپس نظری ۲۰ بیمار با شکستگی مفصل ران با حداکثر تنوع داده‌ها و ۹ نفر غیر بیمار از مراقبت دهندگان حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای وارد مطالعه شدند. جمع‌آوری داده‌های مربوط به فرایند شکل‌گیری مرگ اجتماعی از طریق مصاحبه‌های عمیق نیمه ساختاریافته، یادداشت در عرصه و مشاهده صورت گرفت. تحلیل داده‌ها با رویکرد کوربین و اشتراوس (۲۰۱۵) در مراحل؛ تحلیل داده‌ها برای مفاهیم و توسعه آن‌ها براساس ابعاد و ویژگی‌ها، تحلیل داده‌ها برای زمینه، استخراج فرایند در تحلیل و یکپارچه‌سازی طبقات انجام گرفت. جهت مدیریت و سازمان‌دهی داده‌ها از نرم‌افزار MAXQDA10 استفاده گردید. همچنین از تکنیک‌های پرسیدن سؤالات، یادآور نویسی، مقایسه مداوم و نظری، نوشتن خط داستانی و سایر ابزارهای تحلیلی دیگر جهت تحلیل و ترکیب نظری استفاده شد.

یافته‌ها: پس از تحلیل داده‌ها، ۱ طبقه مرکزی و ۱۶ طبقه اصلی که خود دربردارنده ۵۵ زیر طبقه و ۲۱۲ مفاهیم اولیه بودند؛ استخراج گردید. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که فرایند پایه شکل‌گیری مرگ اجتماعی در افراد مبتلا به شکستگی مفصل ران، خوددیرانگری عامدانه برای رهایی از شرایط و زندگی اجتماعی مختل شده پس از شکستگی است. دغدغه اصلی بیماران پس از شکستگی مفصل ران، حفظ زندگی اجتماعی معنی‌دار شناسایی شد که افراد تحت تأثیر عوامل زمینه‌ای استراتژی و راهبردهای مختلفی در جهت کسب آن به کار گرفته بودند. طبقه تلاش جهت نجات زندگی شامل راهبردهای مثبت و مؤثری بود که به صورت موقت علی‌رغم درک بی‌حاصل بودن تلاش‌ها منجر به دستیابی افراد به زندگی اجتماعی حداقلی می‌شود. طبقه خوددیرانگری عامدانه شامل راهبردها و استراتژی‌هایی غیر مؤثر همچون؛ پس زدن حمایت، چشم‌پوشی از هر دغدغه مندی و مسئولیت نسبت به اطرافیان، تخریب هویت اجتماعی، تشدید خود رنجوری و بی‌تلاشی و رهایی بود که در نهایت منجر به پیامدهایی چون انزوا طلبی و مرگ طلبی در این افراد می‌شود. طبقه مرکزی تحت عنوان خوددیرانگری رهایی‌بخش بیانگر ارتباط تنگاتنگ بین زمینه، فرایند و پیامدهای مرگ اجتماعی می‌باشد.

بحث و نتیجه‌گیری: یافته‌های مطالعه حاضر حاکی از آن بودند که مرگ اجتماعی در برخی افراد مبتلا به شکستگی مفصل ران در فرایندی تحت عنوان «خودپیرانگری عامدانه» رخ می‌دهد. ماهیت بیماری، ویژگی‌های فردی، محیط غیر حامی و ماهیت زندگی اجتماعی- اقتصادی به‌عنوان موانع و تسهیل گرهای مرگ اجتماعی، زمینه و بستر شکل‌گیری این فرایند را فراهم می‌سازند. بیماران در برخورد با اضمحلال تدریجی زندگی معنی‌دار اجتماعی دو نوع استراتژی متناسب با شرایط زمینه‌ای داشتند. با توجه به اینکه فرآیند شکل‌گیری مرگ اجتماعی، فرآیندی اجتماعی، چندبعدی و پیچیده است و تاکنون برای این دسته از بیماران تئوری تبیین‌کننده‌ای برای آن ارائه نگردیده است شناسایی و درک فرایند شکل‌گیری مرگ اجتماعی در این بیماران می‌تواند در جهت طراحی مداخلاتی که به پیشگیری، تعدیل و تغییر این فرآیند کمک نماید؛ نقش مهمی ایفا نماید.

کلیدواژه‌ها: مرگ اجتماعی، انزوا اجتماعی، شکستگی مفصل ران، فرایند، گراند تئوری



**Teheran University of Medical Sciences
School of Nursing and Midwifery**

Title:

**Explore the process of social death in patients with
hip fracture**

**"A dissertation submitted as partial fulfillment of the requirements for
Doctor of Philosophy (PhD) Degree" In Nursing**

By:

Golnar Ghane

Supervisor

Dr Shashavari Homan

Consultants

Dr Zare Zahra

Dr AhmadniaShirin

Dr BabakSiavashi

2022

Abstract

Explore the process of social death in patients with hip fracture

Introduction

Hip fracture is one of the most common orthopedic fractures; It is a common, serious and complex injury that has a partial, challenging and very long recovery process. People with chronic disabilities and uncontrollable long-term complications following a hip fracture also have characteristics that may make them eligible to experience social death. Thus, with the continuous and unhealed physical disability of these patients, factors such as privacy, social participation, independence are endangered. Ultimately, it weakens their social identity, lack of social interactions and social deprivation, which can have dire physical, mental and social consequences. In order to plan for the prevention and control of social death, it is necessary to identify its dimensions and characteristics. Therefore, the aim of this study was to explain and understand the process of formation and development of social death in people with hip fractures.

Method

In the present study, with the approach of grounded theory, 20 patients with hip fractures with maximum data variation and 9 non-patients from professional and non-professional caregivers were enrolled through purposive sampling and then theoretical sampling approach. Data related to the process of formation of social death were collected through in-depth semi-structured interviews, field notes and observation. Data analysis with Corbin and Strauss (2015) approach in stages; was performed data analysis for concepts and their development based on dimensions and features, data analysis for context, and process extraction in categories analysis and classification. MAXQDA10 software was used to manage and organize the data. Also, techniques of asking questions, reminder writing, continuous and theoretical comparisons, storyline writing and other analytical tools were used for theoretical analysis and synthesis.

Results

After analyzing the data, 1 central category and 16 main categories, which included 55 sub-categories and 212 basic concepts; Was extracted. The results of the present study showed that the basic process of formation of social death in people with hip fractures is deliberately self-destruction to get rid of conditions and disrupted social life after fractures. The main concern of patients after hip fracture was to maintain a meaningful social life, which people under the influence of underlying factors had used various strategies and strategies to achieve it.

Efforts to save lives included positive and effective strategies that temporarily lead to minimal access to social life, despite the perceived ineffectiveness of efforts. Deliberately self-destruction includes ineffective strategies such as; Refusal of support was the abandonment of any concern for others, the destruction of social identity, the intensification of self-suffering and lack of effort and liberation, which ultimately led to consequences such as isolation and death seeking in these people. The central category, called liberating self-destruction, expresses the close connection between the context, process, and consequences of social death.

Discussion and conclusion

The findings of the present study suggest that social death occurs in some people with hip fractures in a process called "deliberately self-destruction." The nature of the disease, individual characteristics, unfavorable environment and the nature of socio-economic life as barriers and

facilitators of social death, provide the background for the formation of this process. Patients had two types of strategies appropriate to the context in dealing with significant social life disorders. Given that the process of formation of social death is a social process, multidimensional and complex. So far, no explanatory theory has been presented for this group of patients. Identifying and understanding the process of formation of social death in these patients can be used to design interventions that help prevent, modify and change this process; Play an important role.

Keywords: Social Death, Social Isolation, Hip Fracture, Process, Grounded Theory