



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی تهران
دانشکده پرستاری و مامایی

بررسی علل عدم مراجعه زنان باردار جهت دریافت مراقبت های دوران بارداری و عوامل
مرتبط با آن در زنان زایمان کرده بستری در
زایشگاه بیمارستان هلال احمر ایرانی - دبی در سال ۱۳۹۲

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد مامایی

(گرایش بهداشت مادر و کودک)

استاد راهنما: سرکار خانم شهناز گلپان تهرانی

استاد مشاور: سرکار خانم دکتر مینو پاک گوهر

استاد آمار: جناب آقای دکتر حمید حقانی

پژوهشگر: فاطمه محمد ابراهیم

خرداد ۱۳۹۳

چکیده

مقدمه: بهداشت باروری یکی از ضرورت‌ها و پیش‌نیازهای رسیدن به توسعه پایدار در جوامع کنونی به شمار می‌رود. هدف از این مطالعه بررسی عوامل موثر در عدم مراجعه زنان باردار جهت مراقبت‌های دوران بارداری بوده است.

روش: در این پژوهش مقطعی ۵۲۰ زن باردار که جهت زایمان به بیمارستان هلال احمر ایرانی - دبی مراجعه کرده بودند مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه‌گیری به روش آسان بود و جمع‌آوری اطلاعات بصورت مصاحبه با استفاده از پرسشنامه‌ای که شامل مشخصات دموگرافیکی، وضعیت مراجعه جهت دریافت مراقبت‌های دوران بارداری و عوامل عدم مراجعه زنان باردار جهت دریافت خدمات انجام گرفت.

نتایج: براساس نتایج بدست آمده بین دو گروه مراجعه و عدم مراجعه از نظر سن در اولین حاملگی ($P=0.01$)، سن حاملگی موقع زایمان ($P=0.01$)، سطح تحصیلات مادر ($P=0.00$)، سطح تحصیلات همسر ($P=0.00$)، شغل مادر ($P=0.00$)، شغل همسر ($P=0.00$)، وضعیت اقتصادی ($P=0.002$)، وضعیت بیمه ($P=0.00$)، مذهب ($P=0.017$)، بارداری فعلی ($P=0.01$) اختلاف معنی‌داری داشتند اما از نظر ملیت ($P=0.606$)، سابقه ناباروری ($P=0.643$)، سقط ($P=0.597$)، زایمان زودرس ($P=0.211$)، فرزند زنده ($P=0.46$)، فرزند مرده ($P=0.597$) اختلاف معنی‌دار نبود ($p=0.3$).

نتیجه‌گیری: به‌طور کلی می‌توان چنین نتیجه گرفت که سن در اولین حاملگی، سن حاملگی موقع زایمان، سطح تحصیلات مادر و همسر، شغل مادر و همسر، وضعیت اقتصادی، وضعیت بیمه، مذهب، وضعیت بارداری فعلی عواملی هستند که نقش اساسی در عدم مراجعه برای مراقبت‌های دوران بارداری دارند و بارداری این افراد را پرخطر می‌سازند.

کلیدواژه‌ها: ۱- مراقبت‌های دوران بارداری ۲- زنان باردار ۳- عوامل موثر



Tehran University of Medical Sciences
School of Nursing and Midwifery

A survey of Causes of Failure to Receive Prenatal Care and Associated Factors
in Delivered Women in Iranian Hospital- Dubai ۲۰۱۳

Supervisor: Golian Tehrani Shahnaz, MSc

Advisor: Pakgozar Menoo, PhD

Statistics Advisor: Haghani Hamed, PhD

A Thesis submitted to the Graduate Studies Office

In partial fulfillment of the requirements for

The degree of Master in Midwifery

(branch of Maternal and Child Health)

Student: Mohammad Ibrahim Fatima

۲۰۱۳-۲۰۱۴

Abstract

Background: Reproductive health is one of the essential prerequisites for achieving sustainable development and in contemporary societies is considered. The objective of the present study was to evaluate the effective factors in prenatal care.

Methods: A cross-section study was performed on 520 pregnant women who had delivered in Iranian Red Crescent Hospital-Dubai 1392. Data collected using a questionnaire that included demographic characteristics, referring to the lack of prenatal care and refer pregnant women to get the service done. After authenticating the scientific literature and the opinion of the questionnaire teachers using SPSS software and statistical methods of analysis received. Based on the results obtained in terms of age at first pregnancy ($p=0.01$), Gestational age at birth ($p=0.01$), mother's education, husband's education ($p=0.001$), mother's occupation, husband's occupation ($p=0.001$), socioeconomic status ($p=0.002$), insurance status ($p=0.001$), religion ($p=0.0001$), pregnancy ($p=0.01$) had a significant difference. But in terms of nationality ($P=0.606$), infertility ($P=0.643$), abortion ($P=0.097$), preterm delivery ($P=0.211$), living child ($P=0.46$), son of the dead ($P=0.097$) difference not significant. In general it can be concluded that the age at first pregnancy, gestational age at delivery, maternal education level and husband's mother and wife, socioeconomic status, insurance status, religion, unwanted pregnancy are factors that play a fundamental role in the lack of care for mothers during pregnancy and the risk of these people are Roper.

Key Words: Prenatal care ,pregnant women, Effective Factors