



**دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران**  
**دانشکده پرستاری و مامائی**

عنوان:

بررسی ارتباط بین تنش اخلاقی با درک پرستاران از مراقبت بیهوده در بخش‌های  
مراقبت‌های نوزادان مراکز آموزشی و درمانی کودکان استان آذربایجان غربی در سال

۱۳۹۹

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

نگارنده:

نیلوفر نجفعلی دیزجی

استاد راهنما:

جمال‌الدین بگجانی

۱۳۹۹

## چکیده:


**زمینه و هدف:** شرایط خاص محیط‌های مراقبتی و درمانی، اغلب پرستاران را در معرض تنش‌های متعددی قرار می‌دهد. یکی از این موارد ارائه‌ی مراقبت بیهوده است که همواره همراه با چالش‌های اخلاقی و قانونی می‌باشد. ارائه‌ی مراقبت بیهوده و تنش اخلاقی ناشی از آن توأم با تاثیرات نامطلوب بسیاری از جمله: نارضایتی شغلی، احساس گناه و رنج، افسردگی، ترک شغل و کاهش کیفیت مراقبت در پرستاران می‌باشد. لذا در این مطالعه به بررسی ارتباط بین تنش اخلاقی با درک پرستاران از مراقبت بیهوده در بخش‌های مراقبت‌های ویژه و تخصصی نوزادان پرداخته شده است.

**روش بررسی:** این پژوهش، یک مطالعه‌ی توصیفی-همبستگی بوده که در سال ۱۳۹۹ انجام شد. نمونه‌های پژوهش ۱۱۵ نفر از پرستاران شاغل در بخش‌های مراقبت ویژه و تخصصی نوزادان مراکز آموزشی و درمانی استان آذربایجان غربی بودند که بر اساس معیارهای ورود و با روش در دسترس وارد مطالعه شدند. در این مطالعه از سه ابزار اطلاعات جمعیت‌شناختی، تنش اخلاقی - نسخه‌ی کودکان شامل ۲۱ گویه و ابزار درک از مراقبت بیهوده شامل ۱۷ گویه جهت جمع‌آوری اطلاعات استفاده شد. در نهایت اطلاعات جمع‌آوری شده توسط نرم افزار SPSS نسخه‌ی ۱۶ تجزیه و تحلیل شد.

**یافته‌ها:** نتایج حاصل از مطالعه، مؤید ارتباط مستقیم و معنی‌داری بین دو معیار اصلی تنش اخلاقی و درک از مراقبت بیهوده بود. همچنین در این مطالعه تنش اخلاقی و درک پرستاران از مراقبت بیهوده در سطح متوسط برآورد شد. به علاوه مابین تنش اخلاقی و درک پرستاران از مراقبت بیهوده با تعدادی از اطلاعات جمعیت‌شناختی مورد بررسی در مطالعه‌ی حاضر، رابطه‌ی معنی‌داری مشاهده شد.

**نتیجه‌گیری:** نتایج حاصل از این مطالعه در حالت کلی نشان‌دهنده‌ی ارتباط مستقیم بین درک از مراقبت بیهوده با تنش اخلاقی بود. بر این اساس می‌توان اشاره نمود که ارائه‌ی مراقبت بیهوده یکی از دلایل ایجاد کننده‌ی تنش اخلاقی در پرستاران بخش‌های مراقبت‌های نوزادان می‌باشد که می‌بایست تدابیر لازم جهت پیشگیری و مقابله با تنش اخلاقی ناشی از مراقبت‌های بیهوده در پرستاران و ارتقای آگاهی پرستاران در زمینه‌ی مراقبت‌های بیهوده اتخاذ گردد، تا بتوان به یکی از رسالت‌های اصلی مراکز درمانی که ارتقای مستمر کیفیت مراقبتی و درمانی است نائل آمد.

**واژه‌های کلیدی:** تنش اخلاقی، درک از مراقبت بیهوده، نوزادان، پرستاران



**Teheran University of Medical Sciences  
School of Nursing and Midwifery**

**Title:**

**The Relationship Between Moral Distress with Perception of Futile Care in  
Infants Care Units Nurses in Children's Medical Educational Hospitals of  
West Azerbaijan Province in the ۱۳۹۹**

**A thesis submitted as partial fulfillment of the requirements for Master of Science  
(MSc) Degree in Critical care nursing**

**By  
Niloofer Najafali Dizaji**

**Supervisor (s)  
Dr.Begjani**

**Consultant(s)  
Dr.Mirlashari  
Dr. Dehghan  
Dr.Ranjbar**

**2020**

## ABSTRACT

### **The Relationship Between Moral Distress with Perception of Futile Care in Infants Care Units Nurses in Children's Medical Educational Hospitals of West Azerbaijan Province in the ۱۳۹۹**

**Background:** The specific conditions of care and treatment environments always presented nurses with some challenges. One particular situation is futile care, which is always accompanied by moral and legal challenges. The dominant atmosphere in futile care may lead to moral distress in nurses and its consequences such as: sense of guilt, pain, suffering, job dissatisfaction and job burn out and also decrease the quality of care. In this study, the relationship between moral distress and perception of futile care in nurses of neonatal care units has been investigated.

**Methods:** This research is a descriptive-correlation study that was conducted in 1399. The samples of study were 115 nurses working in neonatal care units of educational and medical centers of west Azerbaijan province who were included in the study based on the inclusion criteria. In this study, two scales of moral distress- pediatric version including 21 items and the perception of futile care scale including 17 items were used to collect data. Finally, the collected data were analyzed by SPSS software version 16.

**Results:** The results of this study showed significantly positive relationship between moral distress and perception of futile care. Also in this study, the moral distress and perception of futile care were estimated in moderate level. In addition, a significant relationship was observed between moral distress and nurses' perception of futile care with some demographic criterias in the present study.

**Conclusion:** The results of this study generally showed a positive relationship between moral distress and perception of futile care. Based on this results, it can be pointed out that providing futile care is one of the reasons of moral distress in nurses in neonatal care units, which should take necessary measures to prevent and deal with moral distress that caused by futile care and increase nurses' awareness in the field of futile care, in order to achieve one of the main missions of medical centers, which is to continuously improve the quality of care and treatment.

**Keywords:** moral distress, perception of futile care, neonates, nurses