



**دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران**

**دانشکده پرستاری و مامایی**

**بررسی نیازهای برآورده نشده و ارتباط آن با سطح خودکارآمدی بیماران مبتلا به سرطان**

**مراجعه کننده به بیمارستان امید شهر مشهد سال ۹۳-۱۳۹۲**

**اساتید راهنما: دکتر زهره پارسا یکتا- دکتر هومن شهسواری**

**نگارش:**

**الهه رمضان زاده تبریز**

**پایان نامه جهت اخذ درجه ی کارشناسی ارشد در**

**رشته پرستاری گرایش داخلی-جراحی**

**شهریور ۱۳۹۳**

## بررسی نیازهای برآورده نشده و ارتباط آن با سطح خودکارآمدی بیماران مبتلا به سرطان

مراجعه کننده به بیمارستان امید شهر مشهد در سال ۹۳-۱۳۹۲

**زمینه و هدف:** سرطان یک بیماری مزمن با مراحل عود و درمان طولانی می باشد که شیوع رو به رشدی دارد. سرطان همه ابعاد زندگی فرد را متاثر می سازد. جهت ارائه مراقبت بهتر، لزوم شناخت و درک نیازها و مشکلات بیماران مبتلا به سرطان اهمیت بسیار دارد. در مدیریت بیماری های مزمن با ابعاد گسترده همچون سرطان خودکارآمدی بیماران نقش محوری دارد. تعیین نیازهای برآورده نشده و سطوح خودکارآمدی بیماران سرطانی با توجه به وضعیت فرهنگی-اجتماعی کشور، لازمه برنامه ریزی برای مراقبت های بیمار محور است. اگرچه نیازهای برآورده نشده و خودکارآمدی در مدیریت بیماری افراد مبتلا به سرطان جزو عوامل کلیدی به حساب می آیند اما تا کنون به بررسی ارتباط این متغیرها پرداخته نشده است. هدف از انجام این مطالعه تعیین نیازهای برآورده نشده بیماران مبتلا به سرطان و ارتباط آن با سطح خودکارآمدی این بیماران است.

**روش کار:** مطالعه حاضر مطالعه ای توصیفی-همبستگی است. این مطالعه بر روی ۳۶۰ بیمار مبتلا به سرطان در بیمارستان امید شهر مشهد به روش نمونه گیری تمام شماری از اسفند ۱۳۹۲ تا تیر ۱۳۹۳ انجام شد و بیماران توسط فرم اطلاعات فردی، پرسشنامه نیازهای برآورده نشده بیماران مبتلا به سرطان (SUNS) و پرسشنامه خودکارآمدی بیماری مزمن (CDSES) مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۲۱ و آزمونهای مختلف آماری بر حسب نوع متغیر تجزیه و تحلیل شدند.

**یافته ها:** نتایج مطالعه نشان داد که میانگین کلی نیازهای برآورده نشده ( $2/20 \pm 0/73$ ) از ۴ می باشد. در بین حیطه های نیازهای برآورده نشده بیشترین نیاز بیماران در حیطه مسائل شغلی و نگرانی های مالی ( $0/95 \pm$ ) و کمترین آن مربوط به حیطه نیازهای عاطفی ( $1/98 \pm 0/92$ ) بود. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین نمره کلی نیاز برآورده نشده و نمره کلی خودکارآمدی همبستگی منفی و معناداری ( $r = -0/24$ ) وجود دارد ( $p < 0/05$ ).

**نتیجه گیری:** پرستاران باید در ارائه مراقبت خود به بیماران سرطانی به اولویت بندی نیازهای برآورده نشده بیماران توجه داشته باشند و از سویی با توجه به وجود ارتباط معکوس میان این نیازها و سطح خودکارآمدی بیماران، ارتقای سطوح خودکارآمدی بیماران را به عنوان یک اولویت مراقبتی مد نظر قرار دهند و مداخلاتی را جهت ارتقای سطوح خودکارآمدی بیماران طراحی و اجرا نمایند.

**واژه های کلیدی:** نیازهای برآورده نشده، خودکارآمدی، سرطان



**Tehran University of Medical Sciences**  
**Faculty of Nursing and Midwifery**

**Relationship between Unmet Needs and Self-Efficacy of Patients  
Suffering from Cancer Admitted to Omid Hospital of Mashhad in  
۱۳۹۲-۹۳**

**By: Elahe Ramezanzade Tabriz**

**Under Supervision of:**

**Dr Zohre Parsa Yekta**

**Dr Hooman Shamsavari**

**Dr Mir Saeed Yekaninejad**

**A Thesis Submitted of the Graduate Studies Office in Partial  
Fulfillment of the Requirement for the Degree of Master in Medical  
Surgical in Nursing**

**September ۲۰۱۴**

## **Relationship between unmet needs and self-efficacy of patients suffering from cancer admitted to Omid Hospital of Mashhad in ۱۳۹۲-۹۳**

**Introduction:** Cancer is a chronic disease with recurrent and long-term treatment that its prevalence is growing. Cancer affects all aspects of life. To provide better care, the necessity of understanding the needs and problems of cancer patients is important. Self-Efficacy has central role in the management of chronic diseases in cancer patients. According to socio-cultural situation, determination the unmet needs and self-efficacy levels of cancer patients, patient-centered care planning is necessary. Although the unmet needs and self-Efficacy in disease management of cancer patients are the key factors, but so far has not Investigated the relationship between these variables. The purpose of this research was to determine the unmet needs of cancer patients and its relationship to self- efficacy in these patients.

**Methods:** This is a cross-sectional, descriptive-correlational study. The study included ۳۶۰ cancer patients admitted to Omid hospital in Mashhad City. Data were collected from February ۲۰۱۴ to June ۲۰۱۴ by Census sampling. The data was gathered by three questionnaires including the demographic information, the Survivor Unmet Needs Survey and the Chronic Disease Self-Efficacy Scales. To determine the measure validity, content validity method was used And Alpha Cronbach were calculated to examine reliability of the measures. Data were analyzed using SPSS software version ۲۱.۰ and statistical tests based on different variables.

**Results:** The results indicated that the mean of total score of unmet needs is ( $۲.۲۰ \pm ۰.۷۳$ ) to ۴. The highest unmet needs score was belonged to concern about work and financial needs ( $۲.۴۷ \pm ۰.۹۰$ ), and the lowest was belonged to emotional needs ( $۱.۹۸ \pm ۰.۹۲$ ). There was a significant and reverse correlation between the total score of unmet needs and the total score of self-efficacy ( $r = -۰.۲۴$ ;  $P < ۰.۰۰۵$ ).

**Conclusion:** For providing care to cancer patients, Nurses must pay attention to Prioritization the unmet needs of patients, and on the other hand, according to the inverse relationship between the unmet needs and level of self-Efficacy, Nurses should consider the self-Efficacy levels improving of patient as a care priority and Design and implement interventions to improve patient self-efficacy level.

**Key words:** unmet needs, self-efficacy, cancer