



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشکده پرستاری و مامایی

بررسی تعاملات گروه همتا در مراقبت از یکدیگر در پرستاران بخش های مراقبت ویژه

استاد راهنمای اول: دکتر محمدعلی چراغی

استاد راهنمای دوم : معصومه ایمانی پور

استاد مشاور آمار: ناصر بحرانی

نگارش : ویدا ترابی

مرداد ۱۳۹۳

عنوان: بررسی تعاملات گروه همتا در مراقبت از یکدیگر در پرستاران بخش های مراقبت ویژه

مقدمه: در وضعیت کنونی نظام سلامت که توجه به هزینه‌ها بیشتر از توجه به مراقبت است و کمبود نیروی انسانی مشهود می‌باشد، پرستاران به دلیل مشغله و بار کاری زیاد در بخشها، خود را غرق در وظایف مراقبتی حرفه‌ای می‌کنند و وقت کمی برای پرداختن به برقراری تعامل مراقبتی از همکاران خود دارند. این مساله در پرستارانی که در بخش ویژه کار می‌کنند، مشهودتر است. بر این اساس و با توجه به پیامدهای منفی عدم مراقبت از یکدیگر که منجر به بروز خشونت بین پرستاران و عوارض ناشی از آن می‌شود، این مطالعه در اولین گام به بررسی موضوع تعاملات گروه همتا در مراقبت از یکدیگر در پرستاران بخشهای ویژه پرداخته است.

مواد و روشها: در این مطالعه مقطعی، ۱۳۵ نفر پرستار آی سی یو و ۱۰۷ نفر پرستار سی سی یو از بیمارستان- های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران که شرایط ورود به مطالعه را داشتند، به روش نمونه گیری سهمیه ای و تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار مطالعه، مقیاس تعاملات مراقبتی گروه همتا بود که توسط لیندا هیوز ابداع شده بود و حاوی ۱۶ گویه و به صورت لیکرت ۶ قسمتی طراحی شده بود و به صورت خودگزارشی تکمیل شد. متغیر مورد مطالعه، میزان تعاملات گروه همتا در مراقبت از یکدیگر بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمونهای تست دقیق فیشر، پیرسون، اسپیرمن و آزمون تی مستقل استفاده شد.

نتایج: یافته ها نشان داد که میانگین امتیاز به دست آمده از پرسشنامه تعاملات مراقبتی گروه همتا، در بخشهای ویژه آی سی سی یو و سی سی یو بین ۷۶-۳۷ (از امتیاز کامل ۹۶) و در محدوده تعاملات بینابینی بود. تعاملات گروه همتا در بخش آی سی سی یو و سی سی یو با هم تفاوت آماری معناداری نداشت ($P > 0.05$). همچنین در آی سی سی یو میزان تعاملات گروه همتا در مراقبت از یکدیگر در با جنسیت رابطه آماری معناداری داشت ($P < 0.05$)، به این صورت که در زنان قوی‌تر بود و همچنین تعاملات گروه همتا در مراقبت از یکدیگر در سی سی یو با سطح تحصیلات رابطه معناداری داشت ($P < 0.05$)، به این صورت که در پرستاران کارشناسی ارشد قویتر از پرستاران کارشناسی بود. سایر مشخصات دموگرافیک ذکر شده با تعاملات گروه همتا در مراقبت از یکدیگر، رابطه آماری معناداری نداشت.

نتیجه گیری: بر اساس نتایج این مطالعه، پرستاران در آی سی سی یو و سی سی یو به میزان کافی از یکدیگر حمایت نمی‌کنند. پرستاران آی سی سی یو و سی سی یو در رفتارهای تعاملی در مراقبت از یکدیگر تفاوتی نداشتند و پرستاران زن در آی سی یو مراقبت و حمایت از یکدیگر قوی تر از مردان عمل کرده‌اند و پرستاران با تحصیلات کارشناسی ارشد در سی سی یو در حمایت از یکدیگر قویتر عمل کرده اند.

واژگان کلیدی: مراقبت از یکدیگر، تعاملات گروه همتا، رفتارهای مراقبتی، پرستار



Tehran University of Medical Science

Faculty of Nursing & Midwifery

Study on peer caring interaction among nurses in critical care settings

Under supervision of Dr. Mohamad Ali Cheraghi

and

Masooome Imanipour

A thesis submitted to the Graduate Studies Office

In partial fulfillment of the requirements for

The Degree of Master in

Critical Care Nursing

By: Vida Torabi

July 2014

ABSTRACT

Introduction: In current state of health system, attention to the cost is more than attention to caring and workforce shortage is evident; accordingly, nurses are so busy in their professional duties that they don't have enough time to care for their peers. This situation among nurses who are working in critical care settings is more visible. Considering that and because the non caring interaction among them has negative outcomes that may cause violence and its complication. In first step, this study has investigated the peer nurses caring interaction in critical care setting.

Material and methods: In this cross sectional study, 135 ICU nurses and 107 CCU nurses from selected hospital of Tehran university of medical sciences and health services met inclusion criteria, were selected by simple random and quota sampling. Peer group caring interaction scale has been used. This scale was invented by Linda Hughes and it includes 16 items and in likert scale (1-6). This self report questionnaire has been completed by participants. Fisher's exact test, Pearson, Spearman, and independent t-test were used to analyze the data.

Result: Results showed that mean obtained scores from the questionnaire in ICU nurses and CCU nurses were between 37-76, meaning that caring interaction among nurse was intermediate. There was no significant differences between level of peer group caring interaction in ICU and CCU ($p>0/05$). Peer group caring interaction with gender in ICU nurses was statically significant ($p<0/005$), meaning which peer group caring interaction was stronger in women than men. Peer group caring interaction with level of education in CCU nurses was statically significant ($p<0/005$), meaning which peer group caring interaction was stronger in master of science nurses than bachelor of science nurses too. There was no significant correlation between peer group caring interaction and other demographic characteristic listed.

Conclusion: Based on these result, and CCU nurses didn't support and care each other enough and there was no differences between caring interaction in ICU and CCU nurses in this regard. Peer nurses caring interaction and supporting among female nurses were stronger than male nurses in ICU and Peer nurses caring interaction among MS nurses were stronger than BS nurses in CCU.

Key word: peer group interaction, caring each other, caring behavior, nurse