



دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی تهران

عنوان:

شایعترین عوارض ایلئوستومی و کولستومی

زیر نظر استاد:

دکتر نسیم امینایی چترودی

دکتر نسرین رسول زاده

گردد آورنده:

امیرحسین خواجه زاده

۱. درماتیت پریستوما: عمده ترین عارضه در بیماران ایلئوستومی است. خروجی ایلئوستومی آبکی، بسیار قلیایی و حاوی آنزیم های پروتئولیتیک است که دائماً پوست پریستوما را تحریک می کند. قرار گرفتن پوست اطراف استوما در معرض مستقیم این مواد خروجی باعث اختلال در یکپارچگی پوستی می شود. در درماتیت پریستوما، پوست اطراف استوما در ابتدا دچار قرمز و خارش شده و در نهایت با سوزش و درد و تدریس بروز می کند.




۲. هرنی پاراستوما: با برجستگی اطراف استوما مشخص شده و CT scan تایید نهایی می شود. شیوع این عارضه در کولستومی بیشتر از ایلئوستومی می باشد. از جمله سایر علائم مرتبط با آن درد، ناراحتی در پوست اطراف استوما و مشکل در قرار گرفتن کیسه استوما و در نتیجه نشت مدفوع است.




۳. خونریزی استوما: خونریزی سطحی ممکن است از وریدهای کوچک یا مویرگ های لبه استوما بروز کند که معمولاً با کوتر و نیترات نقره قابل کنترل است.



۴. پرولاپس استوما: به عنوان بیرون زدگی تمام ضخامت استوما تعریف می شود. روده به صورت معکوس بیرون زده ممکن است مراقبت از استوما را به خطر بیندازد. زمانی که استوما بیش از ۶ تا ۷ سانتی متر بیرون زده شود. بیشتر در ایلئوستومی رخ می دهد.



۵. تنگی استوما: به طور کلی در صورتی که در معاینه فیزیکی، پنجمین انگشت دست معاینه کننده وارد دهانه استوما نشود، تنگی استوما رخ داده است.



۶. توکشیدگی استوما: استوما ۵ میلی متر به داخل کشیده می شود. شیوع ۲ تا ۹ درصدی دارد و تا ۱۷ درصد بروز آن در ایلئوستومی گزارش شده است. عمدتاً به دنبال کوتاه بودن برش جراحی روده و تحرک ناکافی دستگاه گوارش رخ می دهد.



۷. هیپرپلازی استوما: تشکیل ضایعات ندول مانند در استوما که ظاهر آن را از حالت طبیعی خارج می کند. این عارضه معمولاً به دنبال تماس طولانی مدت استوما با رطوبت به وجود می آید.



۸. نکروز استوما در نتیجه خون رسانی ناکافی ایجاد می شود. بروز کلی نکروز استوما بین ۱.۶٪ تا ۲۰٪ متغیر است. نکروز استوما معمولاً در طی چند روز پس از جراحی رخ می دهد اما می تواند در اولین ماه های بعد از عمل ظاهر شود. احتمال ابتلا به نکروز استوما در بیمار چاق نسبت به بیمار غیر چاق هفت برابر بیشتر است.

